

BIOSICHERHEIT

Die Biosicherheit ist eine Maßnahme der Reduktion des Risikos den Krankheitserreger zu verbreiten.

WICHTIGE ASPEKTE der Biosicherheit – Biosicherheit besteht aus drei Punkte

- I. Physische Trennung um einen Kontakt mit dem Erreger zu verhindern
- II. Reinigung und Entfernung sichtbarer Kontaminanten
- III. Desinfektion bzw. Abtötung verbleibender Erreger

I. Physische Trennung um einen Kontakt mit dem Erreger zu verhindern

VOR dem Betreten ist zu beachten:

- (1) Parken des Autos ausserhalb des Kontaminationsbereiches (zB vor dem Hof)
- (2) Nur für die Probennahme relevante Utensilien in den Kontaminationsbereich mitnehmen (Checkliste !); **ACHTUNG:** Schaber (zB Schraubenzieher) für Stiefel und Klebeband nicht vergessen (Uhr und Ring verbleiben im Auto !)
- (3) Gegenstände, die nicht zu desinfizieren sind (zB Handy) in einen verschliessbaren Plastiksack stecken
- (4) Auto vorbereiten:
 - a) Kofferraum mit Plastik ausfüllen (unreiner Bereich !)
 - b) zB Rücksitzbank wird als "reiner" Bereich definiert
- (5) Herstellung der Desinfektionslösung: Virkon® (2%)
- (6) Kontrolle: alle wichtigen/relevanten Utensilien mitgenommen ?



GRENZBEREICH = Desinfektionsgrenze

- (1) Definieren des Desinfektions-Grenze in eine reine und un reine Seite
- (2) Hergestellte Desinfektionslösung an den reinen Bereich der Grenzstelle stellen
- (3) an der Grenze anziehen:
 - a) Stiefel,
 - b) Einweghandschuhe,
 - c) Einwegoverall ÜBER die Handschuhe und die Stiefel ziehen und mit einem Klebeverschluss verschliessen, sowie Kapuze aufsetzen



II. Reinigung und Entfernung sichtbarer Kontaminanten

- (1) Reinigung und Entfernung sichtbarer Kontaminanten
- (2) Alle Utensilien werden auf die unreine Seite der Desinfektionsgrenze gebracht
- (3) Dokumente (Einsendeformulare, Probenbegleitschreiben) in einen verschließbaren Plastiksack geben
- (4) Müll wird von zu desinfizierenden Gegenständen getrennt und in einen Plastiksack gegeben und zugeschnürt (verbleibt noch an unreiner Seite !)



III. Desinfektion bzw. Abtötung verbleibender Erreger

- (1) Alle Utensilien werden desinfiziert: Müllsack (ausssen), Ziplock-Sack (zB Handy, Dokumente)
- (2) Probengefäße aussen desinfizieren und auf die reine Seite legen
- (3) Entfernen des Klebebandes
- (4) Overall ausziehen und in den Müllsack auf der unreinen Seite geben
- (5) Handschuhe ausziehen und in den Müllsack auf der unreinen Seite geben
- (6) Stiefel desinfizieren und in den **reinen Bereich** wechseln
- (7) Mit neuem Paar Handschuhen den Müllsack (Overall, etc) von der unreinen in einen "frischen" Müllsack der reinen Seite überführen und verschliessen



Abschliessende Arbeiten an der Desinfektions-Grenze

- (1) Kübel der unreinen Seite aussen desinfizieren
- (2) Hände und Desinfektionsbereich desinfizieren
- (3) Desinfizierte Utensilien in den Kofferraum geben

