

Nationale Referenzzentrale für Yersinien

Jahresbericht 2022

Wien, 2022

Impressum

Medieninhaber:in und Herausgeber:in:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK),
Stubenring 1, 1010 Wien

Verlagsort: Wien

Redaktion: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
(AGES)

Wien, 2022. Stand: 20. Februar 2023

Copyright und Haftung:

Ein auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig. Dies gilt insbesondere für jede Art der Vervielfältigung, der Übersetzung, der Speicherung auf Datenträgern zu kommerziellen Zwecken, sowie für die Verbreitung und Einspeicherung in elektronische Medien wie z. B. Internet oder CD Rom.

Im Falle von Zitierungen (im Zuge von wissenschaftlichen Arbeiten) ist als Quellenangabe anzugeben: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) (Hg.); Titel der jeweiligen Publikation, Erscheinungsjahr.

Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) und der Autorin/des Autors ausgeschlossen ist. Rechtausführungen stellen die unverbindliche Meinung der Autorin/des Autors dar und können der Rechtsprechung der unabhängigen Gerichte keinesfalls vorgehen

Bestellinfos: Diese und weitere Publikationen sind kostenlos über das Broschürenservice des Sozialministeriums unter www.sozialministerium.at/broschuerenservice sowie unter der Telefonnummer 01 711 00-86 25 25 zu beziehen.

Inhalt

Nationale Referenzzentrale für Yersinien – Jahresbericht 20224

Zusammenfassung..... 4

Summary..... 4

Einleitung..... 5

Methodik 6

Ergebnisse..... 7

Diskussion 12

Danksagung 12

Tabellenverzeichnis..... 13

Abbildungsverzeichnis..... 14

Literaturverzeichnis 15

Abkürzungen..... 16

Nationale Referenzzentrale für Yersinien – Jahresbericht 2022

Zusammenfassung

Im Jahr 2022 wurden 201 *Yersinia* spp.-Erstisolate an die Nationale Referenzzentrale für Yersinien eingesandt. Von den 201 Humanisolaten waren 107 pathogen und 94 apathogen. Von den pathogenen Isolaten wurden 105 Stämme als *Y. enterocolitica* identifiziert – davon 88 als Serovar O:3, Biovar 4. In den restlichen zwei Fällen wurde *Y. pseudotuberculosis* nachgewiesen. Die Inzidenz der durch die Referenzzentrale kulturell bestätigten Yersiniosen lag im Jahr 2022 bei 1,18 pro 100.000 EinwohnerInnen. Von den 105 pathogenen *Y. enterocolitica* Isolaten waren 17 resistent gegenüber Amoxicillin / Clavulansäure, drei Isolate resistent gegenüber Tetracycline und eines gegenüber Co-Trimoxazol. Gegenüber Ampicillin waren alle *Y. enterocolitica* Isolate resistent.

Summary

In 2022, the Austrian National Reference Centre for *Yersinia* received 201 primary isolates of *Yersinia* spp. Of the 201 human isolates, 107 were pathogenic and 94 non-pathogenic. Among the pathogenic isolates, 105 belonged to *Yersinia enterocolitica* (88 were serovar O:3; biovar 4) and two to *Y. pseudotuberculosis*. In 2022, the incidence rate for cases of yersiniosis as confirmed by the National Reference Centre was 1.18 per 100,000 inhabitants. In vitro susceptibility testing of the 105 pathogenic *Y. enterocolitica* isolates revealed seventeen isolates with resistance to amoxicillin/clavulanic acid and three with resistance against tetracycline and one to co-trimoxazol. All *Y. enterocolitica* isolates were resistant to ampicillin.

Einleitung

Seit 01.01.2011 befindet sich die Nationale Referenzzentrale für Yersinien am Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene Graz der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Die Gattung *Yersinia* gehört zur Familie der *Enterobacterales*. Yersinien sind fakultativ anaerobe, Gram-negative, kokkoide bis längliche Bakterien. Als psychrophile Keime können sie bei Temperaturen zwischen 4°C und 42°C angezüchtet werden. Tiere gelten als Hauptreservoir. Zur Gattung *Yersinia* gehören 14 Spezies, von denen drei Arten – *Y. pestis*, *Y. pseudotuberculosis* und einige Biovare von *Y. enterocolitica* – als obligat pathogenen Krankheitserregern humanmedizinische Relevanz zukommt. Weitere Spezies – *Y. kristensenii*, *Y. bercovieri*, *Y. frederiksenii*, *Y. mollaretii*, *Y. intermedia*, *Y. aldovae*, *Y. rohdei*, *Y. ruckeri*, *Y. similis*, *Y. massiliensis* und *Y. aleksiciae* – haben humanmedizinisch nur untergeordnete Bedeutung. *Y. pestis* kommt in Österreich endemisch nicht vor und wird von der Referenzzentrale der AGES am Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene Wien abgedeckt.

Bei *Y. enterocolitica* werden biochemisch sieben Biovare und serologisch zumindest 54 Serovare (Schema von Wauters, Aleksic und Bockemühl) unterschieden [1]. Von klinischer Relevanz sind die Biovare 1B, 2, 3, 4 und 5 sowie die Serovare O:3, O:8, O:9 und O:5,27. *Y. pseudotuberculosis* wird serologisch in sechs pathogene Gruppen eingeteilt, biochemisch zeigen die Stämme kaum unterschiedliche Reaktionen.

In Europa sind *Y. enterocolitica* Stämme des Serovar O:3, Biovar 4 der häufigste Erreger der Yersiniose, am zweithäufigsten ist der Serovar O:9, Biovar 2.

Die enteropathogenen Yersinien (pathogene *Y. enterocolitica* und *Y. pseudotuberculosis*) sind Zoonose-Erreger. Das Hauptreservoir für *Y. pseudotuberculosis* sind verschiedene Säugetiere, bei *Y. enterocolitica* das Schwein, dessen Tonsillen oft besiedelt sind. Die Übertragung erfolgt meist über kontaminierte Nahrungsmittel (Fleisch, Milchprodukte, Wasser) [2]. Da sich die Bakterien auch bei 4°C (z.B. im Kühlschrank) vermehren können, ist eine entsprechende Durcherhitzung der Fleischspeisen von präventiver Bedeutung. Eine direkte Übertragung von infektiösen Tieren auf Menschen oder von Mensch zu Mensch findet sich nur selten. Wiederholt wurden Übertragungen durch kontaminierte Blutkonserven dokumentiert [3].

Die verursachten Erkrankungen – sogenannte Yersiniosen – zeigen ein breites Spektrum. Die Mehrzahl der Yersiniosen wird durch darmpathogene *Y. enterocolitica* verursacht (>

90%), seltener durch *Y. pseudotuberculosis*. Bei Säuglingen und Kleinkindern kommt es meist zu einer selbstlimitierten akuten Gastroenteritis mit Erbrechen, wässrigen bis blutigen Durchfällen und Fieber (Dauer 1-2 Wochen). Typisch für Yersiniosen bei Schulkindern und Jugendlichen ist eine akute mesenteriale Lymphadenitis, begleitet von abdominalen Schmerzen. Das klinische Bild kann einer Appendizitis ähneln („Pseudoappendizitis“). Bei Erwachsenen kommen unterschiedliche klinische Formen vor, wie grippale Infekte mit Pharyngitis, Myalgie und Fieber, oder eine Ileokolitis mit Beteiligung der mesenterialen Lymphknoten („Pseudocrohn“). Manchmal treten bei Patientinnen und Patienten mit Grunderkrankungen auch extramesenteriale, fokale Infektionen wie Hepatitis, Pleuritis, Perikarditis, Endokarditis oder Septikämie auf. Yersiniosen können mit Begleit- oder Folgeerscheinungen assoziiert sein: reaktive Arthritis besonders bei HLA-positiven Patientinnen und Patienten, Morbus Reiter, Erythema nodosum gehäuft bei Frauen, Arthralgie oder Myalgie. *Y. enterocolitica* führt eher zu einem gastroenteritischen Krankheitsbild, *Y. pseudotuberculosis* häufiger zu einer Pseudoappendizitis.

Methodik

Von österreichischen mikrobiologischen Laboren werden verdächtige Bakterienisolate an die Nationale Referenzzentrale für Yersinien zur biochemischen Identifizierung, Biotypisierung, Serotypisierung sowie zum Nachweis phänotypischer Pathogenitätsmerkmale (Autoagglutinationstest [1]) gesandt. Die Zahlen der dem öffentlichen Gesundheitsdienst angezeigten Yersiniosen („Meldungen“) stammen aus dem Epidemiologischen Meldesystem des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz mit Stand 30.01.2023 [4]. Die Einwohnerzahlen der Bundesländer Österreichs wurden den Internetseiten der Bundesanstalt Statistik Österreich [5] entnommen.

Ergebnisse


Im 2022 wurden mit Stand 30.01.2023 in Summe 130 Fälle von Yersiniose an das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gemeldet (Abb.1) und insgesamt 201 humane Erstisolate an die Nationale Referenzzentrale für Yersinien eingesandt. Bei den Isolaten wurden 107 als pathogen (105 *Y. enterocolitica*, zwei *Y. pseudotuberculosis*) identifiziert. Die restlichen Isolate wurden als apathogen eingestuft – 84 *Y. enterocolitica* Biovar 1A Isolate, drei *Y. frederiksenii*, drei *Y. bercovieri*, drei *Y. kristensenii* und ein *Y. massiliensis* Isolat (Abb.2).

Entsprechend der Sero- und Bio-Typisierung gehörte der überwiegende Teil der pathogenen *Y. enterocolitica* Stämme dem Serovar O:3, Biovar 4 (88 Isolate; 84%) an. Daneben fanden sich noch 17 Isolate mit Serovar O:9, Biovar 2 (16%) (Abb. 3).

Bei 38 von 107 pathogenen Isolaten gab es auf den Einsendescheinen Angaben zum klinischen Verlauf. Bezogen auf diese 38 Einsendungen wurden in zweiundzwanzig Fällen Durchfall (57, 9%), in elf Bauchschmerzen (28,9%), in drei Fällen (7, 9%) Erbrechen und in drei Fällen das Auftreten von Fieber (7, 9%) berichtet (Mehrfachnennungen von Symptomen waren möglich).


Im Jahr 2022 sind zwei Fälle importiert worden, jeweils einer aus Kuba und Spanien. Bei beiden importierten Isolaten handelte sich um *Y. enterocolitica* Serovar O:3, Biovar 4.

Abbildung 1 Gemeldete Yersiniose-Fälle




Gemeldete Yersiniose-Fälle, Österreich, 2001-2022 (Quelle: *Jahresberichte des BMSGPK 2001-2021, **vorläufige Statistik meldepflichtiger übertragbarer Infektionskrankheiten des BMSGPK 2022 mit Stand 30.01.2023)

Abbildung 2 Ergebnisse der biochemischen Typisierung




Ergebnisse der biochemischen Typisierung humaner Erstisolate, Österreich, 2022, Nationale Referenzzentrale für Yersinien

Abbildung 3 Serovar- und Biovar-Verteilung der pathogenen *Y. enterocolitica* Stämme



Serovar- und Biovar-Verteilung der pathogenen *Y. enterocolitica* Stämme, Österreich, 2022, Nationale Referenzzentrale für Yersinien

Abbildung 4 Inzidenz der pathogenen Erstisolate pro Bundesland




Inzidenz der pathogenen Erstisolate pro Bundesland, Österreich, 2022, Nationale Referenzzentrale für Yersinien (NRZY)

Der jahreszeitliche Verlauf für das Jahr 2022 ist in Abb. 5 dargestellt. Wie im Jahr 2021 sind auf Grund der niedrigen Fallzahl keine statistisch signifikanten jahreszeitlichen Schwankungen feststellbar.

Die Alters- und Geschlechtsverteilung der PatientInnen mit pathogenen Yersinien ist in Abbildung 6 angeführt.


Die Nationale Referenzzentrale für Yersinien führt bei allen Isolaten eine Antibiotikaresistenzprüfung mittels Agardiffusionstest durch. Das Resistenzverhalten gegen Ampicillin, Amoxicillin/Clavulansäure, Cefotaxim, Gentamicin, Ciprofloxacin und Co-Trimoxazol wird nach Vorgaben von EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) [6] und gegenüber Tetracyclin nach Vorgaben des CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) [7] bestimmt. Die Auswahl der getesteten Antibiotika erfolgt nach epidemiologischen und nicht nach klinisch-therapeutischen Gesichtspunkten. Die *Y. pseudotuberculosis* Isolate waren empfindlich gegenüber allen getesteten Antibiotika. Das Resistenzverhalten der pathogenen *Yersinia enterocolitica* Isolate ist in Tabelle 1 dargestellt.

Abbildung 5 Vergleich der jahreszeitlichen Verteilung der pathogenen Yersinien



Vergleich der jahreszeitlichen Verteilung der pathogenen Yersinien, Österreich, 2021 und 2022, Nationale Referenzzentrale für Yersinien

Abbildung 6 Verteilung der pathogenen Yersinien nach Alter und Geschlecht



Verteilung der pathogenen Yersinien nach Alter und Geschlecht, Österreich, 2022, Nationale Referenzzentrale für Yersinien

Tabelle 1 Antibiotikaresistenz von pathogenen *Yersinia enterocolitica* Isolate

Serovar	Biovar	Anzahl	Anzahl der Resistenzen						
			AMP	AMC	CTX	CN	CIP	TE	SXT
0:3	4	88	88					3	1
0:9	2	17	17	17					

Anzahl der gegenüber einem Antibiotikum resistenten pathogenen *Yersinia enterocolitica* Isolate, aufgeschlüsselt nach Serovar und Biovar, Österreich, 2022, Nationale Referenzzentrale für Yersinien. Ampicillin (AMP), Amoxicillin/Clavulansäure (AMC), Cefotaxim (CTX), Gentamicin (CN), Ciprofloxacin (CIP), Tetracyclin (TE), Co-Trimoxazol (SXT)

Diskussion

In Österreich beträgt die Inzidenz der dem Bundesministerium gemeldeten Yersiniosen per Stand 30.01.2023 1,43 pro 100.000 EinwohnerInnen (2021: 1,54; 2020: 1,43; 2019: 1,26; 2018: 1,55; 2017: 1,08) sowie für an der Nationalen Referenzzentrale untersuchte pathogene Yersinien-Isolate 1,18 pro 100.000 EinwohnerInnen (2021: 1,17; 2020: 1,04; 2019: 1,04; 2018: 1,48; 2017: 1,06). Yersiniosen sind damit – im Vergleich zu anderen Durchfall-Erkrankungen, wie z.B. Campylobacteriosen und Salmonellosen – in Österreich eine nach wie vor nur selten vorkommende Erkrankung. Im Jahre 2022 hat es entsprechend den an der NRZY vorliegenden Daten keine Hinweise auf Erkrankungshäufungen gegeben.

Danksagung

Wir danken allen Einsendern und Gesundheitsbehörden für die gute Zusammenarbeit.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Antibiotikaresistenz von pathogenen <i>Yersinia enterocolitica</i> Isolate	11
--	----

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Gemeldete Yersiniose-Fälle	8
Abbildung 2 Ergebnisse der biochemischen Typisierung.....	8
Abbildung 3 Serovar- und Biovar-Verteilung der pathogenen <i>Y. enterocolitica</i> Stämme	9
Abbildung 4 Inzidenz der pathogenen Erstisolate pro Bundesland.....	9
Abbildung 5 Vergleich der jahreszeitlichen Verteilung der pathogenen Yersinien	10
Abbildung 6 Verteilung der pathogenen Yersinien nach Alter und Geschlecht	11

Literaturverzeichnis

[1] U.S. Food and Drug Administration. Bacteriological Analytical Manual Chapter 8 *Yersinia enterocolitica*, <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bam-yersinia-enterocolitica>

[2] European Centre for Disease Prevention and Control
<https://www.ecdc.europa.eu/en/yersiniosis/facts>

[3] Guinet F, Carniel E, Leclercq A. Transfusion transmitted *Yersinia enterocolitica* sepsis. *Clin Infect Dis.* 2011; 53:538-591.

[4] <https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Statistiken-und-Fallzahlen.html>

[5] Bundesanstalt Statistik Österreich – Statistik Austria (Hrsg.).
<https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/bevoelkerungsstand/bevoelkerung-zu-jahres-/-quartalsanfang>

[6] European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), Breakpoint tables of interpretation of MICs and zone diameters
http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/Breakpoint_table_v_12.0.xls

[7] CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 32nd ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2022

Abkürzungen

Y.	<i>Yersinia</i>
EUCAST	The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
CLSI	Clinical and Laboratory Standards Institute
BMSGPK	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Stubenring 1, 1010 Wien

+43 1 711 00-0

post@sozialministerium.at

sozialministerium.at